

SATISFACCIÓN CON EL TRATAMIENTO Y CALIDAD DE VIDA DE LOS PACIENTES CON HEMOFILIA



HOSPITAL UNIVERSITARIO
RÍO HORTEGA
Valladolid

Fernández Contreras, M^a Antonia ; Mulero Mulero, M^a Teresa.

INTRODUCCION

Los **cuestionarios de calidad de vida** en hemofilia son una oportunidad para que los pacientes comuniquen su estado de salud y sus experiencias con el tratamiento.

Nosotras nos lo planteamos como una manera de **mejorar nuestra atención** al paciente y conocer de cerca qué les preocupa.

OBJETIVOS

Nuestro objetivo eran::

- Describir la **satisfacción con el tratamiento** (factor de coagulación).
- Conocer la **calidad de vida** de una muestra de los pacientes atendidos en nuestro hospital.
- Mejora de la atención prestada.

MÉTODO

Se distribuyeron encuestas entre los pacientes hemofílicos que atendemos. 22 pacientes participaron tras ser informados y dar su consentimiento por escrito.

Los cuestionarios usados fueron:






1. Datos Clínicos y Demográficos.
2. Satisfacción con la medicación (SATMED-Q y Adicionales)
3. Calidad de vida (EQ-5D, EVA y A-36)

Los resultados de los cuestionarios fueron analizados de acuerdo a su manual.

Los métodos de distribución fueron: en el hospital, correo ordinario y correo electrónico.


RESULTADOS

Edad media 35,6 años, la mayoría de diagnóstico temprano. Media de tiempo con el actual factor de coagulación 7,25 años. El 42,9 necesita ayuda del personal sanitario para administrarse el factor.



ADICIONALES

Opiniones de los pacientes	Si, Mucho	Bastante	Ni mucho ni poco	Algo	No, Nada
El almacenamiento es fácil	18,8	37,5			43,8
La preparación es fácil	29,4	23,5			47,1
Encontrar la vena es fácil	12,5	12,5	25	6,3	43,8
La administración es fácil	23,5	17,6	17,6		41,2
La administración es rápida	23,5	17,6	5,9	11,8	41,2
Me pincho de forma accidental	6,7			13,3	80
Es fácil deshacerse de las jeringas y agujas	17,6	23,5	11,8		47,1
Las inyecciones me producen ansiedad	5,6	5,6	11,1	5,6	72,2
Me siento bien pinchándome yo mismo	25	6,3			68,8



CONCLUSIONES

Los resultados sugieren que hay pacientes que muestran dificultades en la administración del factor y que esto puede mejorar con un mejor entrenamiento y seguimiento multidisciplinar. Esperamos que esta información nos ayude a mejorar la atención que les prestamos.

