

ACERCANDO LA TERAPIA AL PACIENTE

AUTORES: de la Calle Gil Milagros, Aparicio Rite Ana, Muñiz Anarte Carmen, Lama Rufián Mercedes.
ÁREA DE GESTIÓN SANITARIA SUR DE SEVILLA

OBJETIVOS

- Revisar aquellas consideraciones prácticas que, sobre la detección precoz de toxicidades con el tratamiento de bortezomib y 5 azaticidina, pueden ser relevantes para el personal de Enfermería.
- Concienciar más si cabe al personal de Enfermería de su importante papel en el abordaje terapéutico de esta patología, con la detección de posibles toxicidades y una mejor canalización de la información paciente-hematólogo.

MATERIAL Y MÉTODOS



SESIÓN DE PROFESIONALES DE ENFERMERÍA

NEUROPATÍA PERIFÉRICA: EVALUACIÓN Y DETECCIÓN
INSTRUCCIONES PARA LOS PACIENTES
REDONDEAR UN NÚMERO POR LÍNEA,
TENIENDO EN CUENTA LO SUCEDIDO EN
LOS 7 ÚLTIMOS DÍAS

	No	Un poco	Algo	Bastante	Mucho
Tengo entumecimiento u hormigueos en mis manos	0	1	2	3	4
Tengo entumecimiento u hormigueos en mis pies	0	1	2	3	4
Tengo molestias en mis manos	0	1	2	3	4
Tengo molestias en mis pies	0	1	2	3	4
Tengo dolores articulares o calambres musculares	0	1	2	3	4
Me siento débil	0	1	2	3	4
Tengo problemas auditivos	0	1	2	3	4
Tengo un zumbido o ruido en mis oídos	0	1	2	3	4
Tengo problemas para abrocharme los botones	0	1	2	3	4
Tengo problemas para sentir la forma de pequeños objetos cuando los tengo en las manos	0	1	2	3	4
Tengo problemas al caminar	0	1	2	3	4

CUESTIONARIO RESUMIDO DE EVALUACIÓN DE NEUROPATIA PERIFÉRICA

Fecha

¿TIENE SU PACIENTE ALGÚN SÍNTOMA DE NEUROPATÍA PERIFÉRICA?

La Neuropatía Periférica es una sintomatología común en los pacientes con Mieloma Múltiple. Detectarla y tratarla a tiempo es esencial para su pronta resolución. Marque con un círculo si durante los últimos 7 días...

	No	Muy Poco	Poco	Bastante	Mucho
1 Ha sentido hormigueo o adormecimiento en los pies y/o manos	0	1	2	3	4
2 Ha tenido dolor en las articulaciones o calambres	0	1	2	3	4
3 Ha tenido problemas de audición	0	1	2	3	4
4 Ha tenido problemas para abrocharse los botones	0	1	2	3	4
5 Ha presentado problemas al sentir pequeños objetos cuando los coge en su mano	0	1	2	3	4

PREPARACIÓN



Y ADMINISTRACIÓN

CONCLUSIONES

- Es importante conocer las toxicidades que pueden presentarse con el tratamiento de bortezomib y 5-azaticidina como con cualquier otro quimioterápico.
- En la mayoría de los casos son toxicidades reversibles .
- Sin lugar a dudas, su detección precoz y valoración permite un manejo de la administración de los tratamientos (ajuste de dosis o esquema) que permite, en la mayoría de los casos, la posibilidad de continuar la terapia.
- No obstante, en los últimos años, la aparición de la administración subcutánea de estas medicaciones ha contribuido a minimizar la aparición de toxicidades y ha aportado otra serie de ventajas para pacientes y personal sanitario

Perspectivas: ¿Futura administración ambulatoria?