

INFLUENCIA DEL DISPOSITIVO DE ADMINISTRACIÓN EN LA ADHERENCIA

Autores: Pravos González, M.J. Álvarez Martínez, E: H. Vall d'Hebrón (Barcelona).
Bosch Ferrando, P. Hospital la Fe (Valencia). Fernández Álvarez, MJ: H. Regional Málaga
Fernández Contreras, M.A. Mulero Mulero, M T: H.R.Hortega (Valladolid)

Introducción

En las patologías crónicas, como es el caso de la hemofilia, la falta de adherencia al tratamiento farmacológico es un problema prevalente y relevante en la práctica clínica.

En el contexto de las enfermedades crónicas, la OMS considera la No adherencia un tema prioritario y de salud pública debido a sus consecuencias negativas: fracasos terapéuticos, mayores tasas de hospitalización y aumento de los costes sanitarios.

Objetivo

El propósito de este estudio fue conocer la satisfacción del paciente con hemofilia A grave respecto al uso de la jeringa precargada con un rango de edad comprendidas entre 16 y 45 años.


Método

El método utilizado en este estudio de satisfacción fueron las encuestas telefónicas, parámetros como las preferencias en el uso de diferentes dispositivos de suministro, reconstitución del producto, facilidad en el manejo, dificultad en la venopunción y mejoras a realizar ante el nuevo dispositivo de FVIII fueron algunos de los ítems a cuestionar.


Resultados

Al analizar los datos de las encuestas realizadas telefónicamente al 30% de los pacientes que presentan Hemofilia A grave. Obtuvimos unos resultados en el que el paciente en tratamiento a demanda y profiláctico con FuseNGo presenta un grado de satisfacción alto hacia el nuevo dispositivo de reconstitución.


FACILIDAD EN EL MANEJO.




MEJORAS A REALIZAR




PRACTICIDAD Vial Vs FuseNGo



TRATAMIENTO EN EL DÍA A DÍA



RECONSTITUCIÓN PASO A PASO



Conclusiones

- La falta de adherencia es un problema común con repercusiones sanitarias y económicas.
- Con la evidencia disponible, no se puede afirmar que haya ninguna intervención específica para mejorar la adherencia. La combinación de varias parece ser la mejor estrategia.
- Analizar las causas individualmente: En el caso del dispositivo FuseNGo® existe una buena aceptación por parte de los pacientes. Y con mejoras potenciales del sistema, aún facilitaría más la adherencia.