



Mejora de la calidad asistencial en Hospital de Día Oncohematológico: Administración del Rituximab subcutáneo.

Hospital Parque Tenerife

Hospital de Día
Oncohematológico

 UNIDAD HOSPITALARIA.

 ESTANCIA MEDIA DE LOS PACIENTES.

 CALIDAD DE VIDA.

✚ FUNCIONALIDAD ASISTENCIAL .

✚ TIPOS DE TRATAMIENTOS.

✚ PERFIL DE LOS PACIENTES ONCOHEMATOLÓGICOS.



 INNOVACIONES TERAPÉUTICAS.

 MEJORAS EN LA CALIDAD DE VIDA DEL PACIENTE.


 APORTE CON MAYOR EFICACIA.

-  ANTICUERPO MONOCLONAL CON FORMULACIÓN SUBCUTÁNEA.
-  ADMINISTRACIÓN MEDIANTE INYECCIÓN.
-  AHORRO DE TIEMPO PARA EL PACIENTE Y PROFESIONAL SANITARIO.
-  MISMA RESPUESTA TERAPÉUTICA.

ENZIMA HIALURONIDASA

 ENZIMA HUMANA RECOMBINANTE.

 VIA SUBCUTÁNEA: ABSORCIÓN EN POCOS MINUTOS.



 LINFOMA NO-HODKING FOLICULAR.

 LINFOMA NO-HODKING DIFUSO DE CÉLULAS B GRANDES.

-  ES UN CÁNCER QUE AFECTA PREDOMINANTEMENTE A GANGLIOS, BAZO, Y MÉDULA ÓSEA SIN DESCARTAR QUE EN OCASIONES TAMBIÉN AFECTE A LA SANGRE PERIFÉRICA Y LUGARES EXTRANODALES.
-  CRECIMIENTO LENTO Y DE DIFÍCIL CURACIÓN.
-  LOS NUEVOS RÉGIMENES DE TRATAMIENTO BASADOS EN LA INMUNOQUIMIOTERAPIA HAN PERMITIDO QUE LA SUPERVIVENCIA MEDIA HAYA MEJORADO.

-  TIPO DE LINFOMA FRECUENTE.
-  CRECIMIENTO RÁPIDO Y AGRESIVO.
-  TUMORACIÓN DE RECIENTE APARICIÓN REGIONES GANGLIONARES O EN CUALQUIER OTRA LOCALIZACIÓN.
-  ASTENIA, ANOREXIA... SÍNTOMAS GENERALES O INESPECÍFICOS.
-  COMPRESIÓN, DOLOR, MAL ESTAR, INFILTRACIÓN DE ÓRGANOS ADYACENTES EN CASOS DE TUMORES GANGLIONARES INTERNOS.

 ENSAYO *SABRINA*. REACCIONES GRAVES ASOCIADAS GRADO 3.

-ERUPCIÓN EN EL LUGAR DE LA INYECCIÓN.

-SEQUEDAD DE BOCA.

REACCIONES ADVERSAS NOTIFICADAS POR EL USO DE RITUXIMAB SUBCUTÁNEO



¡MUCHAS GRACIAS POR VUESTRA ATENCIÓN!

DAVINIA RODRÍGUEZ PÉREZ

UNIDAD ONCO-HEMATOLOGÍA Y BANCO DE SANGRE
HOSPITAL PARQUE. SANTA CRUZ DE TENERIFE

